酒精与怀孕 您需要知道什么



Chinese (Simplified) | 简体中文


在澳大利亚,

50%

的怀孕



是计划外的



酒精会影响胎儿包括大脑 和器官的正常发育



酒精会通过胎盘

由于发育过程中胎儿的肝脏直到妊娠 晚期才完全形成,所以胎儿血液酒精含 量与母亲的相同甚至更高,并且会在该 水平上保持更长时间



没有 安全饮酒时间 安全饮酒剂量

孕期任何时候,没有任意量的酒精可以确保对发育中的胎儿完全"安全"或"无风险"。

孕期饮酒有哪些风险?



胎儿酒精谱系障碍 (FASD)

是一项诊断术语,用于描述严重的神经发育障碍,这种障碍由胎儿出生前接触酒精所造成的脑损伤引起。这些障碍可能包括语言、记忆、社交和行为方面的困难。

6

健康怀孕的秘诀

- ※ 请勿饮酒
- ₹ 请勿吸烟或使用违禁药品
- ❷ 限制咖啡因摄入量
- ✔ 健康饮食
- ✓ 补充叶酸及铁元素
- ✓ 规律的运动
- ▼ 充足的睡眠
- ✔ 避免接触杀虫剂等环境毒素



一些FASD 患者会有明 显的面部特 征,但大多数 人没有 FASD患者 既有优势 也有困难

FASD 会造成 终生影响

所有FASD患者大脑的不同部分都会受到损伤

一些FASD 患者会出现 先天缺陷

您可以做出改变



<u>与您的朋友及家人谈谈孕期饮酒的问题</u> 支持一位孕妇不要饮酒



若您对上述事宜有任何 问题或需要帮助,请与您的 家庭医生、助产士或产科医生联系